



BRANCHE	SECTION(S)	ÉPREUVE ÉCRITE
Mathématiques 2	B	Durée de l'épreuve 4 heures
		Date de l'épreuve 24. 05. 2017
		Numéro du candidat

- I. a) On donne la fonction $g : x \mapsto x^2 - 2 \ln x$.
- Déterminer la fonction dérivée de g et étudier le sens de variation de g .
 - En déduire le signe de g .
- b) On donne la fonction $f : x \mapsto \frac{1 + \ln x}{x} + \frac{x}{2}$.
- Étudier les variations de f [domaine de définition, limites et branches infinies, dérivée première, signe de la dérivée (on peut utilement se servir du signe de g étudié sous a)), tableau de variation, dérivée seconde et concavité, courbe représentative].
 - Déterminer, si possible, le(s) point(s) de la courbe représentative \mathcal{C}_f qui admet(tent) une tangente parallèle à la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$.
Établir, dans chaque cas, une équation cartésienne et tracer la tangente.
 - Déterminer le point d'intersection de la courbe représentative \mathcal{C}_f et de la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$.
Calculer l'aire du domaine D_λ délimité par \mathcal{C}_f , la droite Δ et la droite d'équation $x = \lambda$ où $\lambda > 1$.
Déterminer la valeur de λ pour que l'aire de D_λ soit égale à 2 unités d'aire.

[(2+1)+(7+2+4)=16 points]

II. On donne $f : x \mapsto \begin{cases} e^{x-1} & \text{si } x \leq 1 \\ b + a \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad (a, b \in \mathbb{R})$

- Déterminer les valeurs des paramètres réels a et b pour que la fonction f soit continue et dérivable sur \mathbb{R} .
- On prend $a = 1$ et $b = 1$.
 - Esquisser le graphe de la fonction f .
 - Calculer l'aire de la partie D du plan délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = e$;
 - Calculer le volume engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la partie D .

[4+(2+3+5)=14 points]

- III. a) Déterminer le nombre de solutions de l'équation d'inconnue x

$$(m + 2) 3^x + (2m + 3) 3^{-x} - 2m = 0$$

où m est un paramètre réel.

- b) Résoudre :

i. $(\log_3 x)^2 = 2 \log_3 19683 + \log_3 (x^3)$

ii. $\ln(2e^x - 5) > \ln(13e^{-x} - 30e^{-2x})$.

[6+(3+5)=14 points]

- IV. a) On donne la fonction $f : x \mapsto \frac{1 - 2 \ln x - 2 \ln^2 x}{x^2}$.

Trouver, si elles existent, les abscisses des points de la courbe représentative de f qui admettent une tangente passant par l'origine du repère.

- b) Calculer :

i. $\int_1^\pi \sin(\ln x) dx$

ii. $\int_0^1 x(1-x)^{2017} dx$

- c) On donne les fonctions

$$f : x \mapsto 2 - x^2$$

$$g : x \mapsto x^2.$$

Construire, dans un même repère orthonormé du plan, les représentations graphiques de f et de g .

Déterminer le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe des ordonnées de l'ensemble des points

$$D = \{M(x; y) \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \text{ et } g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

[5+(4+3)+4=16 points]